NOTICE
Before using this product, read the entire label

AVIS
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

Zintrac 700

REGISTRATION NUMBER 980013B
FERTILIZERS ACT

NUMERO DE ENREGISTREMENT 980013B
LOI SUR LES ENGRAIS

A liquid fertilizer for the correction of zinc deficiency in fruit and vegetable crops, potatoes and corn

For foliar or soil application

Engrais liquide pour corriger la carence en zinc sur les arbres fruitiers, légumes, pommes de terre et maïs

Pour application foliaire ou sol

Guaranteed analysis:

Analyse garantie:

Zinc (Zn) (actual/réel) 40%

See back of pack for further information

Voir au verso pour de plus amples renseignements

Contents/Contenu
10 litres

Net weight/Poids net
17.34 kg

Made in the U.K./Fabriqué au R.U. PHOSYN plc, Pocklington, York YO42 1DN

LCA4751

Zintrac 700

CAUTION: This fertilizer contains zinc and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.

FOLIAR DOSE RATES AND TIMINGS

This product should be used only on the basis of soil or tissue analysis.

Apples, Pears: 1 l/ha at bud burst and at the end of flowering. Avoid treatment during flowering. A further application should be made after harvest but before leaf senescence. On russet-sensitive varieties, delay applications until 6 weeks after flowering.
Water rate: 500 to 1,000 l/ha.

Beans (dry edible): 0.5 to 1 l/ha when crop is 5 to 15 cm tall.
Water rate: 200 l/ha.

Cereals (Barley, Oats, Wheat): 0.5 to 1 l/ha from 2 leaf stage to first node detectable (Zadok's G.S. 12 to 31). Water rate: 200 l/ha.

Cole crops (Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Calabrese, Cauliflower): 1 to 2 l/ha at the 4 to 9 leaf stage. Water rate: 200 l/ha.

Corn, Sweetcorn: 1 l/ha at 6 to 8 leaf stage. For severe deficiency, a repeat application should be made 10 to 14 days later.
Water rate: 200 l/ha.

Potatoes: 1 l/ha one week after 100% emergence. For moderate to severe deficiency, a repeat application may be necessary 10 to 14 days later. Also, apply during tuber bulking following petiole analysis.
Water rate: 200 l/ha.

Raspberries, Strawberries: 0.5 l/ha at green bud. Strawberriews: Also after harvest. Water rate: 200 to 500 l/ha.

For further information please contact phosyncanada@phosyn.com.

SOIL APPLICATION

All crops: 3 to 10 l/ha, applied pre-planting or pre-emergence.
Water rate: 50 l/ha minimum.

DIRECTIONS FOR USE

ALWAYS FOLLOW THESE LABEL INSTRUCTIONS.

Shake the container thoroughly before use. Pour through the top filter into the tank three-quarters filled with water, whilst agitating. Top up with water and continue to agitate until spraying is completed.

Tank Mixing: Read ALL labels carefully and adhere strictly to the instructions for use and advice regarding whether or not product(s) should be tankmixed. Many variables, outside the control of PHOSYN, can influence the performance of tankmixed products and therefore tankmixing is entirely at the risk of the end-user. It is strongly recommended that a limited crop area only is treated initially when using unfamiliar tankmixes. *Before tankmixing products you, or your advisor, must visit www.tankmix.com for important information. Alternatively, contact PHOSYN for specific advice.*

Precautions: *Not for application to crops under glass or polythene.* Avoid application under extremes of climate, e.g. rapid drying conditions, extremely slow drying conditions, frost, rain, or when frost or rain are anticipated. Wear suitable gloves and faceshield when handling this product. Clean all equipment before and after use.

STORAGE

Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and animals. *Protect from frost and other climatic extremes.*

CONDITIONS OF SALE - LIMITED WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY

PHOSYN warrants that the product within the unopened container conforms to the chemical description on this label. The directions on this label must be followed carefully and are based on tests, believed to be reliable. As the occurrence of unusual weather or soil conditions, and the use of this product, are all beyond the control of the manufacturer, no guarantee, expressed or implied, is made as to the effects of such use or the results obtained, and in no event shall the liability of PHOSYN exceed the price of the product used. The purchaser must assume all risks of storage, use or application of this product. Goods are sold subject to the standard Conditions of Sale of the manufacturer, available on request or at www.phosyn.com. Use of the product implies that the purchaser accepts these Conditions of Sale.

07.06.04 - replaces all previous labels.

Zintrac 700

AVERTISSEMENT: Cet engrais renferme du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos.

APPLICATION FOLIAIRE - DOSES ET STADES

Ce produit ne doit être utilisé que suite à l'analyse de sol ou de feuilles.

Céréales (Orge, Blé, Avoine): 0,5 à 1 l/ha du stade 2 feuilles au stade premier noeud decelable (Zadok 12-31). Volume d'eau: 200 l/ha.

Crucifères (Broccoli, Calabrèse, Choux, Choux de Bruxelles, Choux-fleur): 1 à 2 l/ha au stade 4-9 feuilles. Volume d'eau: 200 l/ha.

Haricots secs: 0,5 à 1 l/ha au stade 5-15 cm. Volume d'eau: 200 l/ha.

Fraisiers, Framboisiers: 0,5 l/ha au stade boutons verts. Fraises: Encore après la cueillette. Volume d'eau: 200-500 l/ha.

Maïs, Maïs Doux: 1 l/ha au stade 6-8 feuilles. En cas de carence sévère répéter l'application après 10-14 jours. Volume d'eau: 200 l/ha.

Poiriers, Pommiers: 1 l/ha au débourrement et au fin de la floraison. Eviter l'application pendant la floraison. Appliquer encore après la cueillette avant la sénesence des feuilles. Sur les variétés sensibles au russetting retarder les applications jusqu'à 6 semaines après la chute des pétales. Volume d'eau: 500-1.000 l/ha.

Pommes de Terre: 1 l/ha une semaine après la levée. En cas de carence moyenne à sévère répéter l'application si nécessaire après 10-14 jours. Aussi appliquer pendant la grossissement suite à l'analyse pétiolaire. Volume d'eau: 200 l/ha.

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter phosyncanada@phosyn.com.

APPLICATION AU SOL

Toutes cultures: 3 à 10 l/ha avant plantation ou émergence.
Volume d'eau: 50 l/ha minimum.

MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie aux trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

Mélange en cuve: Lisez TOUTES les étiquettes soigneusement et adhérez strictement aux instructions et aux conseils concernant la possibilité ou la non possibilité de mélanger le(s) produit(s). Beaucoup de facteurs, en dehors du contrôle de PHOSYN, peuvent influencer la performance du mélange en cuve, de ce fait celui-ci est entièrement au risque de l'utilisateur. Nous recommandons vivement qu'une surface limitée soit traitée initialement avec tous nouveaux mélanges en cuve. *Avant que vous, ou votre conseiller, ne réalisiez les mélanges en cuve vous devez visiter www.tankmix.com pour toutes informations importantes.*

Precautions: *Ne pas appliquer sur cultures sous serre ou sous plastique.* Eviter les applications par des conditions climatiques extrêmes, ex. rapidité de séchage, séchage extrêmement lent, gelée, pluie, ou lorsque la gelée ou la pluie est prévue. Porter un masque et des gants appropriés lors de la manutention des concentrés. Nettoyer tout équipement avant et après utilisation.

STOCKAGE

Conservez le produit dans un local frais et sec prévu à cet effet, hors de la portée des enfants et des animaux. *Protégez le produit du gel et des conditions climatiques extrêmes.*

CONDITIONS DE VENTE - LIMITE DE GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

PHOSYN garantit que le produit contenu à l'intérieur du récipient non ouvert est conforme à la description chimique qui figure sur l'étiquette. Les instructions sur l'étiquette doivent être suivies avec précision et s'appuient sur des tests qui sont réputés fiables. L'utilisation de ce produit dans des conditions climatiques ou des situations de sol particulières, ainsi que son usage, n'étant pas sous le contrôle du fabricant, aucune garantie, exprimée ou implicite, ne peut être faite quant aux effets ou aux résultats obtenus et, dans tous les cas, la responsablité de PHOSYN n'excèdera pas le prix du produit utilisé. L'acheteur doit assumer tous les risques liés au stockage, à l'utilisation ou à l'application de ce produit. Toute vente est soumise aux conditions générales de vente du fabricant qui sont disponibles sur demande ou peuvent être consultées sur le site www.phosyn.com. L'utilisation du produit implique que l'acheteur accepte ces Conditions de Vente.

07.06.04 - remplace toutes étiquettes précedentes.

LCA4752